

Définition : Un cas cliniquement évocateur de dengue est défini par l'association :

- d'une fièvre élevée (température rectale ou tympanique $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) de début brutal et évoluant depuis moins de 10 jours
- et d'un symptôme algique (céphalées \pm arthralgies \pm myalgies \pm lombalgies)
- et l'absence d'autre point d'appel infectieux.

Surveillance des cas cliniquement évocateurs de dengue


Depuis la 2^{ème} semaine de novembre jusqu'à la fin de l'année (S2016-45 à 52), le nombre hebdomadaire estimé de cas cliniquement évocateurs de dengue* est resté à un niveau faible habituellement observé en période inter-

épidémique, compris entre 10 et 45 cas (Figure 1).

Au total, pour l'ensemble du territoire, 220 cas cliniquement évocateurs de dengue ont été estimés sur cette période.

| Figure 1 |

Surveillance des cas cliniquement évocateurs de dengue, Guyane, janvier 2014 à décembre 2016 / *Estimated weekly number of dengue-like syndromes, French Guiana, January 2014 - December 2016*



*L'estimation du nombre de cas cliniquement évocateurs de dengue est la somme du nombre de consultations enregistrées pour ce motif par les Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS) et les Forces Armées de Guyane (FAG), ainsi que l'estimation du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour ce motif (estimation réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles).

Surveillance des cas confirmés

Depuis la 2^{ème} semaine de novembre jusqu'à la fin de l'année (S2016-45 à 52), aucun cas biologiquement confirmé de dengue n'a été

rapporté. Les derniers cas confirmés de dengue ont été recensés en août, il s'agissait de 2 cas importés dus au sérotype DEN-2.

Analyse de la situation épidémiologique

* Echelle du risque épidémique : ■ Cas sporadiques ■ Foyers épidémiques ■ Pré-épidémie ■ Epidémie ■ Retour à la normale

Au cours des deux derniers mois, l'activité liée au virus de la dengue était calme sur le territoire guyanais. Aucun cas confirmé de dengue n'a été identifié sur cette période.

La situation épidémiologique de la dengue correspond toujours à la phase 1 du Psage* : « cas sporadiques ».

*Psage : Programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies.

Nos partenaires

La Cellule de Veille, d'Alerte et de Gestion Sanitaires de l'ARS (Dr Philippe Tabard, Rocco Carlisi, Claire-Marie Cazaux, Hélène Euzet), l'infirmière régionale de Veille Sanitaire Hospitalière (Christelle Prince), le réseau de médecins généralistes sentinelles, les services hospitaliers (urgences, laboratoires, services d'hospitalisation), les Centres délocalisés de prévention et de soins, le CNR Arbovirus de l'Institut Pasteur de la Guyane, ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance épidémiologique.



Directeur de la publication

Dr François Bourdillon, directeur général de SpFrance

Rédacteur en chef

Fabrice Quet, coordonnateur scientifique de la Cire Guyane